SI-CATプロジェクトにおける 力学DSデータセットの構築

佐々井 崇博 (東北大)

東北大 山崎, 菅野, 福井, 岩崎
気象研 佐々木, 川瀬, 村田, 野坂
JAMSTEC 杉本

SI-CAT (東北大G) : H29年度の業務計画

モデル自治体等と連携して選定した対象領域で、領域気候モデルの現在気候における検証、改良を引き続き行うとともに、近未来気候について力学的ダウンスケーリングを実施し、気候シナリオの作成を行う。

岐阜県における洪水評価と将来予測

- 洪水流出、土砂災害等の解析にあたっては、1時間程度の時間解像度の時系列データが必要
- 地形性の降雨の表現が可能で、中小河川流域単位の議論、各地域の山地斜面の安定性等の議論が可能な空間解像度 → **2km程度**
- ➔ **5kmアンサンブル実験から豪雨事例を抽出し、2kmダウンスケーリング**
- ➔ **各流域での洪水評価・将来予測**

長野県：雪課題

雪の予測：生態系(ライチョウ、シカ等)、水資源、スキー産業、雪害
重要領域：乗鞍休暇村を含めた、北アルプスをカバーする領域

(高い空間解像度で！)

長野県の作業：

- ・ サンプルデータによる雷鳥モデルの試計算
- ・ 過去実験5kmの県内データによる評価
- ・ 過去実験5kmデータ解析
- ・ DSデータの受け入れ準備
- ・ 1kmデータ整備・雷鳥モデルの準備

→ 数回の会合を含め、密な連携

領域モデル：気象研究所非静力地域気候モデル(NHRCM)

格子間隔：5km、1km (, 2km)

初期値・境界値：

1. d4PDF 20km解像度 : d4PDF-DS (今後、d2PDFも追加)

2. 気象庁55年長期再解析(JRA-55) : JRA55-DS

★JRA55はd4PDFと同じ領域 & 設定で20km格子間隔で計算。

3. SI-CAT 5km-DSデータ

物理過程：

境界層過程 : Improved Mellor-Yamada Level3 (MYNN)

地表面過程 : Improved MRI/JMA-SiB (iSiB), SPUC(都市モデル) など

雲微物理 : Bulk-type cloud microphysics [Ikawa et al.,1991]

積雲対流 : Kain-Fritsch [Kain and Fritsch 1993]

※都市モデル実装、地形が高め等

初期時刻：7月24日～翌年8月30日まで計算,

過去実験(12)

将来4K実験(12)

将来2K実験(12)

実験デザイン

高解像度
地域気候モデル
NHRCM
(5km解像度)

地球シミュレーター(ES)

12メンバ=360年分

12メンバ=360年分

12メンバ=360年分

2km/1km
解像度

領域気候モデルによる力学ダウンスケーリング

「20km → 5km → 1km 解像度」

	5km	1km
過去実験	372yr	15yr
非温暖化実験	×	×
将来2K実験	372yr	15yr
将来4K実験	372yr	15yr
再現実験(JRA)	31yr	1yr

計算中

積雪量: 解像度の比較 (20km vs 5km vs 1km)

地形

積雪(3/31) (HPB_m004_1981)

「解像度や対象領域」と「計算資源」とのバランス

日本の降雪：西高東低の気圧配置時の日本海側の降雪
南岸低気圧による太平洋側の降雪

いずれの場合も、時に災害を引き起こすよう大雪となることがある。

【例】2014年2月の南岸低気圧、2017年の山陰大雪等

[河島ほか, 2015; 伊豫部ほか, 2015; Honda et al. 2016]

低頻度の強い降雪に着目し、強い降雪を統計的・面的に調べた研究はほとんどない。(計算機資源、サンプル数の問題)

－研究目的－

d4PDFをもとに、SI-CAT力学DSチームが計算した5km高解像度アンサンブル実験を用いて、**強い降雪の地域分布及び発生時の総観場**の特徴を明らかにする。

結果:全降雪日の気圧型分類 (d4PDF-DS 1メンバー 31年)

西高東低型

- 日本海側
- 愛知県～岐阜県
- 四国西部
- 九州北部

南岸低気圧型

- 関東内陸
- 四国東部

両方の型

- 東北の平洋側
- 山陽等

西高東低型と南岸
低気圧型境界は、
やや不明瞭

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 (%)

結果:強い降雪上位30事例の分類 (全メンバー 310年)

全降雪の分類より
地域差が明瞭

西高東低型

- 日本海側
- 愛知県～岐阜県
- 四国西部
- 九州北部

南岸低気圧型

- 東北の太平洋側
- 関東内陸
- 甲信
- 紀伊半島東部
- 四国東部
- 瀬戸内

結果

2018/1/22の南岸低気圧
(衛星画像は1/23)

メンバー 310年)

全降雪の分類より
地域差が明瞭

32

32

西高東低型

- 日本海側
- 愛知県～岐阜県
- 四国西部
- 九州北部

南岸低気圧型

南岸低気圧型

- 東北の太平洋側
- 関東内陸
- 甲信
- 紀伊半島東部
- 四国東部
- 瀬戸内

寒気流出：質量フラックスの比較(過去vs将来4K)

過去実験

4度上昇実験

西高東低の気圧配置における降雪は、
温暖化とともに減少することを示唆する。

4度上昇実験

372

0

3000 (hPa m s⁻¹)

まとめ

自治体ニーズに合わせた近未来予測を目的とした 力学ダウンスケーリングデータセットの構築

- 1、大規模アンサンブル実験(20km -> 5km -> 1km 力学DS)
- 2、データセット活用事例1:積雪パターンやその要因(現在)
- 3、データセット活用事例2:メソスケールの寒気流出解析

現在、本データセットの再現性を確認中。

今後の方向性;

- 1kmDS計算まで行い、長野県へデータ提供
- DIASへのデータセット公開を予定